

 NEMOCNICE HOŘOVICE	INFORMOVANÝ SOUHLAS SPONTÁNNÍ POROD PO PŘEDCHOZÍM CÍSAŘSKÉM ŘEZU
	IS - 002 G Verze: 01

Identifikační údaje pacienta/ky:	Identifikační údaje zákonného zástupce, opatrovníka:
Jméno a příjmení:	Jméno a příjmení:
Rodné číslo:	Rodné číslo:
Trvalé bydliště:	Trvalé bydliště:
Zdravotní pojišťovna:	Vztah k pacientovi:
Oddělení:	

Vážená paní,

protože se významným způsobem podílíte na léčebných postupech navržených u Vaší osoby, máte právo být před Vaším rozhodnutím o těchto postupech podrobně informována. Vaše předchozí těhotenství bylo ukončeno císařským řezem a nyní máte před sebou rozhodnutí, jakým způsobem porodit v tomto těhotenství tak, aby to bylo bezpečné pro Vás i Vaše dítě. Jsou tu dvě možnosti – přirozený (vaginální) porod nebo plánovaný císařský řez. Vaginální porod po předchozím císařském řezu může být bezpečný za předpokladu, že u Vás nejsou jednoznačné důvody, které by vedení porodu vaginálně znemožnili a také, že průběh současného těhotenství vytvořil vhodné podmínky pro porod přirozenou cestou.

Za jakých okolností byste neměla porod vaginální cestou po předchozím císařském řezu podstoupit:

- pokud byl řez na děloze veden jiným způsobem než jako příčný řez v dolní části dělohy
- pokud jste podstoupila operaci na děloze s větším zásahem do stěny děložní (např. operaci myomu)
- pokud u Vás došlo k trhlíně dělohy při předchozím porodu
- pokud byl předchozí císařský řez proveden před méně než 18 měsíci
- pokud je z ultrazvukového vyšetření podezření na významné ztenčení jizvy po předchozím císařském řezu
- pokud máte v anamnéze 2 a více císařských řezů
- pokud existuje jiný důvod k provedení císařského řezu (např. poloha plodu, včasná placenta, závažné onemocnění matky apod.)
- pokud zásadně odmítáte spontánní porod po císařském řezu
- pokud se předpokládá velký plod

Větší šanci na úspěšný porod mají ženy, které už alespoň jednou vaginálně porodily a u kterých porod začne přirozeně bez nutnosti vyvolání. Úspěšnost vaginálního porodu snižuje případná situace, že byl předchozí císařský řez proveden z důvodu nepostupujícího porodu, nadměrná velikost plodu nad 4000g, vyšší věk či obezita matky.

Jaké jsou možné komplikace a rizika:

Nejzávažnějším rizikem při vaginálně vedeném porodu je protržení děložní stěny v místě jizvy po předchozím císařském řezu. Při této komplikaci může být plod ohrožen úmrtím z nedostatku kyslíku a matka život ohrožujícím krvácením, které si může vyžádat i odstranění dělohy při operaci. Riziko protržení dělohy je vyšší, pokud porod nezačne spontánně a je nutné ho vyvolávat. Příznaky děložního poranění mohou být – silná bolest v podbřišku, náhlá zástava děložní činnosti, abnormální záznam na monitoru ozev plodu, krvácení matky, krev v moči, v nejzávažnějších případech se mohou objevit i známky šoku z krvácení. Při podezření na protržení stěny děložní je nutné těhotenství či porod neodkladně ukončit **císařským řezem**.

Při rozhodnutí o vedení porodu vaginální cestou je nezbytné celý porodní děj pečlivě sledovat. Součástí sledování je monitorace srdečních ozev plodu a sledování plynulého postupu porodu. Děložní činnost může být podporována pomocí infuze s oxytocinem (hormon vyvolávající stahy dělohy). Pokud porod nepostupuje optimálně, bývá společně s Vámi rozhodnuto o jeho ukončení císařským řezem i v jeho průběhu, neboť prodloužený porod také zvyšuje riziko protržení dělohy.

Rodit spontánně po císařském řezu můžete i v případě, že se jedná o předčasný porod nebo naopak přenášíte.

Možnost epidurální analgezie při porodu - metoda používaná ke zmírnění porodních bolestí podáním malé dávky směsi znečítlivujících látek do epidurálního prostoru páteře. Epidurální prostor je místem, kudy procházejí nervy vedoucí mimo jiné i bolest při porodu. Bližší informace o ní Vám podá lékař – anesteziolog.

Jaký je režim pacientky po porodu:

Po spontánně vedeném porodu zůstává rodička 2 hodiny na porodním sále ke sledování. Nenastanou-li komplikace, je pacientka přeložena na oddělení šestinedělí.

Pokládáme za nezbytné Vás o všech rizicích informovat a zároveň Vás chceme ubezpečit, že metody moderního porodnictví jsou koncipovány tak, aby se komplikacím v co největší míře dařilo předcházet.

V případě volby císařského řezu jako způsobu ukončení těhotenství je třeba vzít v úvahu, že císařský řez je zatížen rizikem komplikací vyplývajících z každé operace, jako je krvácení, pooperační infekce, ucpávání cév krevní sraženinou, poranění některého orgánu v dutině břišní, neprůchodnost střevní po operaci, či vyšší riziko podání krevní transfuze. Nelze opomenout také riziko komplikací, které souvisí s nutností použít celkové nebo svodné anestezie.

Při komplikovaném průběhu operace může dojít v některých případech k nezbytnosti odstranění dělohy. Císařský řez může vést i k některým komplikacím vztahující se na budoucí graviditu, ke kterým patří „uhnízdění“ placenty v jizvě, srůsty v dutině břišní, které znesnadňují každou další operaci včetně císařského řezu.

Vysvětlující pohovor provedl dne:

(razítko a podpis lékaře)

1) Prohlašuji, že jsem byl/a řádně a srozumitelně lékařem informován/a (poučen/a) o důvodu, předpokládaném výsledku, způsobu provedení, následcích i možných komplikacích výkonu. Dále mi byly vysvětleny možné alternativy včetně jejich komplikací a zdravotní následky, pokud výkon nepodstoupím (odmítnu). Obdržel/a jsem poučení o výkonu, které jsem si přečetl/a.

Měl/a jsem možnost klást lékaři doplňující dotazy, a pokud tomu tak bylo, na veškeré mé dotazy jsem obdržel/a vysvětlení, kterému jsem porozuměl/a.

2) Bylo mi podáno vysvětlení, že v případě výskytu neočekávaných komplikací vyžadujících neodkladné provedení dalších výkonů k záchraně života a zdraví, budou tyto výkony provedeny.

3) Byl/a jsem seznámen/a s právem pacienta odmítnout navrhovaný postup anebo kdykoliv odvolat svůj souhlas s výkonem. Přečetl/a jsem si celý obsah tohoto informovaného souhlasu před tímto výkonem.

S provedením výše uvedeného výkonu souhlasím a „Informovaný souhlas“ svobodně a bez jakéhokoliv nátlaku vlastnoručně podepisuji.

Datum.....

.....
Podpis pacienta/ky,
zákonného zástupce, opatrovníka

Vyplní lékař:

Pacient(ka) není schopen(a) podpisu. Svůj souhlas vyjádřil(a):

- aktuální stav pacienta neumožnil jeho vyjádření k navrženému postupu/výkonu
- pacient (zákonný zástupce-identifikace) odmítl podepsat

z důvodu:.....

Způsob projevu souhlasu:

Způsob projevu nesouhlasu:

Datum:

Podpis svědka/ů:

Podpis a jmenovka lékaře: