

AUTOTRANSFÚZE PŘED PLÁNOVANOU OPERACÍ V NEMOCNICI V HOŘOVICÍCH

Vážený kliente,

váš lékař u Vás plánuje operační výkon, u kterého lze předpokládat větší krevní ztrátu s nutností hradit tuto ztrátu ať již při operaci nebo po ní. Typickou operací je náhrada kyčelního či kolenního kloubu, ale i např. velké břišní výkony či cévní operace apod. Zvýšení Vaší bezpečnosti a ochrany před komplikacemi při převodu „cizí krve“ je jednoznačným důvodem k zajištění Vaší vlastní krve k operaci, pokud to Váš zdravotní stav dovolí.

Proto si pečlivě přečtěte informace a dbejte pokynů Vašeho lékaře. Zejména požádejte svého praktického lékaře, aby předoperační vyšetření bylo včas a v požadovaném rozsahu provedeno, protože při přijetí do nemocnice den před operací již není prostor k dodatečnému vyšetřování.

Nedostatečné či neúplné předoperační vyšetření je bohužel důvodem k odložení operace a velkým problémem s hledáním náhradního termínu, protože operace se plánují dlouho dopředu a expirace (trvanlivost) autotransfúzí je jen 35 dní.

Odebírají se **minimálně 2 autotransfúze** (po cca 400 ml), za jistých okolností raději 3. Výsledný počet je dán náročností výkonu, Vaším celkovým zdravotním stavem, komplikujícími nemocemi, laboratorními výsledky apod.

Postup:

- Lékař indikující operaci vyznačí na „žlutém listě“ předoperačního vyšetření rozsah vyšetření, **počet žádaných autotransfúzí** a sdělí Vám časový plán odběrů
- V určených termínech se dostavíte na transfúzní stanici Nemocnice Hořovice

Termíny:

- 2 autotransfúze - 3 a 2 týdny před plánovaným nástupem k operaci
- 3 autotransfúze - 4, 3 a 2 týdny před plánovaným nástupem k operaci (pozdější termín není u jinak zdravých pacientů kontraindikací, ale není vhodný, protože se nestačí doplnit buněčné složky krve)

K poslednímu odběru (2 týdny před operací) si přineste všechna zatím provedená vyšetření a laboratorní výsledky. Po odběru se dostavte na anesteziologickou ambulanci ke kontrole průběhu a rozsahu předoperačního vyšetření, aby se minimalizovaly problémy při přijetí k hospitalizaci.