	IS_NH_GYNPOR_019 Medikamentózní_umělé ukončení_těhotenství	Strana č./Celkem stran: 1/4
		Verze: 02 Platnost od: 13.06.2023

Identifikační údaje pacientky	
Jméno a příjmení	
Rodné číslo	
Trvalé bydliště	
Zdravotní pojišťovna	
Oddělení	Gynekologicko-porodnické

Identifikační údaje zákonného zástupce, opatrovníka	
Jméno a příjmení	
Rodné číslo	
Trvalé bydliště	
Vztah k pacientce	

Vážená paní,

protože se významným způsobem podílíte na diagnostickém a léčebném postupu navrženém u Vaší osoby, máte právo být před Vaším rozhodnutím o těchto postupech podrobně informována. Prosíme, přečtete si pečlivě předkládanou specifikaci s informacemi. Informace jsou potřebné k tomu, abyste se mohla rozhodnout a dát souhlas s výše uvedeným výkonem (dále „metodou“).

Medikamentózní ukončení těhotenství a výkony s ním spojené (cena léků a gynekologická vyšetření, odděleně případný odběr krve a cena protilátky při negativitě krevního Rh faktoru) nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a jejich cena je platná dle aktuálního ceníku.

Důvod (indikace) a účel tohoto výkonu

Umělé ukončení těhotenství (UUT) na vlastní žádost ženy.

Vysvětlení výkonu

Nechirurgická interrupce se provádí na základě Vaší žádosti (možné provést do 49. dne od prvního dne poslední menstruace nebo do stáří těhotenství 6 týdnů a 6 dnů dle ultrazvukového vyšetření).

Tuto metodu nelze provést v případě umělého přerušení těhotenství ze zdravotní indikace.

Jedná se o medikamentózní umělé ukončení těhotenství (UUT), složené z několika fází. Podstatou je odloučení a vypuzení plodového vejce z dutiny děložní na základě podání specifických chemických látek (ve formě perorálních tablet – užití ústy).


Výhodou medikamentózního UUT je, že se nejedná o chirurgický zákrok s nutností celkové anestezie a s rizikem chirurgické komplikace (např. poranění dělohy).

Nevýhodou je riziko selhání metody nechirurgického (medikamentózního) ukončení těhotenství – při dodržení schváleného protokolu 1–3 %. (V tomto případě nelze uplatňovat nárok na vrácení platby.)

V případě pokračujícího těhotenství se doporučuje chirurgické ukončení těhotenství, protože po užití přípravků mifepriston/misoprostol existují potenciálně vysoká rizika pro plod.

Postup při provádění výkonu

Metodě předchází vstupní gynekologické vyšetření lékařem, vč. ultrazvukového vyšetření, z kterého bude provedena fotodokumentace pro prokazatelnost stanovení délky těhotenství (**tuto metodu lze**

	IS_NH_GYNPOR_019 Medikamentózní_umělé ukončení_těhotenství	Strana č./Celkem stran: 2/4 Verze: 02 Platnost od: 13.06.2023
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

využit do 7. týdne těhotenství, tj. 49 dní amenorey, rozhodující je naměřená hodnota CRL – velikost embrya), která bude založena do ambulantní karty pacientky.

Samotná metoda má následující fáze:

1. Perorálně, tj. ústy, Vám bude podáno (spolknete) 600 mg mifepristonu (přípravek Mifegyne® - 1 tbl.). Už po užití přípravku může začít vaginální krvácení. **Alespoň 1 hodinu po užití přípravku musíte zůstat ve zdravotnickém zařízení** z důvodu možných nežádoucích účinků – zvracení, alergické reakce. Nutnost delšího pobytu posoudí lékař. V případě bezproblémového průběhu poté odcházíte domů.
S sebou dostanete další informace o nechirurgickém (medikamentózním) umělém ukončení těhotenství v písemné formě a **bezpečnostní kartu** s kontakty a údajem o další povinné návštěvě.
2. **48 hodin poté** Vám bude perorálně podáno (spolknete) 400 mcg misoprostolu (přípravek Mispregmol® - 1 tbl.). **Alespoň 1 hodinu po užití tohoto přípravku musíte zůstat ve zdravotnickém zařízení.** Embryo může být vypuzeno do několika hodin po užití přípravku Mispregmol, max. však do 48 hodin. Dostaví se vaginální krvácení, které může trvat až 12 dnů; může být různé intenzity a s postupem času slábne.
3. **Za 14-21 dnů po užití prvního přípravku Mifegyne® (600 mg mifepristonu) je potřeba se dostavit na kontrolní návštěvu u registrujícího gynekologa.** Tato návštěva je důležitá, protože lékař zkontroluje, že ukončení těhotenství proběhlo úspěšně a ujistí se, že je vše v pořádku. V případě nekompletního odloučení a vypuzení plodového vejce lze podle aktuální délky trvání těhotenství a Vašeho přání postupovat následujícím způsobem
 - chirurgická metoda (instrumentální revize dutiny děložní),
 - pokračování těhotenství (v tomto případě existuje vysoké riziko abnormálního vývoje plodu a je nutné podrobné ultrazvukové zhodnocení morfolgie plodu ve specializovaném centru).

Alternativy výkonu

Další možností umělého ukončení těhotenství v I. trimestru je chirurgické ukončení těhotenství prováděné v celkové anestezii.

Možné komplikace a rizika

Komplikace nejsou časté, nicméně vzácně mohou nastat. Vzhledem k mechanismu účinku a vstřebávání podávaných látek mohou nastat především tyto komplikace

- *Zvracení po užití podávaných preparátů* může nastat u obou těchto léků. Příčinou je podráždění trávicího traktu látkami v nich obsaženými. Pokud zvracení nastane do 45 minut od užití léku Mifegyne® nebo do 30 minut od užití léku Mispregmol®, nedojde k jejich dostatečnému vstřebání a účinnost této metody je tak ohrožena. Proto pokud ke zvracení dojde v této době, bude Vám nabídnuto opětovné podání konkrétního léku zdarma. Pokud

odmítnete, nemůžeme Vám garantovat udávanou účinnost této metody ukončení těhotenství.

- *Vaginální krvácení* jako takové je základním průvodním jevem této metody přerušeni těhotenství, avšak v případě abnormální odpovědi organismu na podané látky může dojít k nadměrnému krvácení, které může ohrozit Vaše zdraví. Jak poznat nadměrné krvácení se dozvíte v informačním materiálu pro pacientky. Léčba této komplikace může vyžadovat hospitalizaci a případně provedení revize dutiny děložní v celkové anestezii.
- *Infekce vnitřních pohlavních orgánů* je vzácně popisovanou komplikací této metody UUT. Léčba této komplikace spočívá v nasazení antibiotik a eventuálně další terapii.
- *Nedostatečné odloučení a vypuzení plodového vejce* je možnou komplikací této metody UUT a je třeba se na ni připravit. Ve většině případů nelze této komplikaci předejít žádným opatřením. Že došlo k nedostatečnému odloučení a vypuzení plodového vejce se zjistí až při kontrolním vyšetření po 14-21 dnech od podání obou výše zmiňovaných preparátů. Léčba této komplikace obvykle vyžaduje provedení instrumentální revize dutiny děložní v celkové anestezii.

Režim před výkonem

Před zahájením této metody UUT je potřeba absolvovat vyšetření u registrujícího gynekologa, který na základě tohoto vyšetření sepíše žádost o umělé ukončení těhotenství. Poplatek za interrupci je stanoven dle aktuálního ceníku NH. V ceně je zahrnut jak poplatek za předepisované léky, tak i náklady na zdravotní péči související s tímto výkonem.

Vzhledem k tomu, že se jedná o neinvazivní metodu přerušeni těhotenství, před jednotlivými kroky, ze kterých se skládá, není potřeba dodržovat speciální režimová opatření.

Režim pacientky po provedení výkonu (důsledky zákroku)

Mimo vyšetření v nemocnici je vhodné dodržovat zvýšenou hygienu (jen sprchování, nekoupat se), abstinenci pohlavního styku a fyzické šetření. Tato opatření by se měla dodržovat do první menstruace po výkonu, která nastává většinou za 4-6 týdnů.

Po ukončení celé metody (potvrzení kompletně vypuzeného plodového vejce při ultrazvukové kontrole po 14-21 dnech) je vhodné okamžitě zahájit používání některé z metod antikoncepce.

Při nekomplikovaném průběhu by neměla nastat žádná změna zdravotního stavu nebo zdravotní způsobilosti.

Vysvětlující pohovor provedl/a	
Místo	v Hořovicích
Datum	
Čas	
Jméno a podpis lékaře	

PROHLÁŠENÍ PACIENTKY/ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE/OPATROVNÍKA

- Prohlašuji, že jsem byla řádně a srozumitelně lékařem informována (poučena) o důvodu, předpokládaném úspěchu, způsobu provedení, následcích i možných komplikacích plánovaného výkonu (dále „metody UUT“).
- Dále mi byly vysvětleny možné alternativy včetně jejich komplikací a zdravotní následky.
- Prohlašuji, že nemám žádné mně známé zdravotní komplikace či jiné obtíže, které by bránily výše uvedené metodě UUT.
- Byla jsem informována a poučena, že léky či jiné látky, které užívám, mohou způsobit komplikace během výkonu. Jsem si vědoma, že je v mém zájmu informovat o nich lékaře před plánovaným výkonem.
- Měla jsem možnost klást lékaři doplňující dotazy, a pokud tomu tak bylo, na veškeré mé dotazy jsem obdržela vysvětlení, kterému jsem porozuměla.
- Byla jsem seznámena s léčebným režimem, vhodnými preventivními opatřeními a možnými kontrolními zdravotními úkony.
- Bylo mi podáno vysvětlení, že v případě výskytu neočekávaných komplikací vyžadujících neodkladné provedení dalších výkonů k záchraně života a zdraví, budou tyto výkony provedeny.
- Jsem si vědom/a, že mé osobní údaje a údaje o mém zdravotním stavu budou poskytnuty v případě poškození mého zdraví pojišťovně, u které má Nemocnice Hořovice pojištění odpovědnosti za škodu a pojištěnému makléři spravujícímu tato pojištění. Zúčastnění jsou povinni dodržovat příslušnou legislativu k ochraně osobních údajů.
- Jsem si vědoma, že plánovaná metoda UUT může být provedena jiným lékařem, než od kterého jsem obdržela poučení.
- Byl/a jsem seznámena s právem pacienta odmítnout navrhovaný postup anebo kdykoliv odvolat svůj souhlas s metodou UUT.
- Zavazuji se uhradit poplatky spojené s UUT dle platného ceníku Nemocnice Hořovice.
- Přečetl/a jsem si celý obsah tohoto informovaného souhlasu před touto metodou UUT.

Prohlášení pacientky/zákonného zástupce/opatrovníka	
<input type="checkbox"/> Souhlasím s medikamentózním umělým ukončením těhotenství a „Informovaný souhlas“ svobodně a bez jakéhokoliv nátlaku vlastnoručně podepisuji.	
Místo	V Hořovicích
Datum	
Čas	
Podpis pacientky Podpis zákonného zástupce/opatrovníka	