

Příprava před aplikací kontrastní látky

- **bez alergické anamnézy**
premedikace není nutná – dle metodického listu ČRS z 1/07
- alergická anamnéza
lehčí forma
 - Dithiaden (2 tbl. per os 2 hod. před vyšetřením)
 - **polyvalentní alergie a astma bronchiale, alergie na k.l.**
 - prednison tbl. 40 mg 12 hod. před aplikací k.l. a 20 mg 6 hod. před aplikací k.l.
 - v akutním případě 40 mg kortikoidů i.v. (Solu-Medrol, Metylprednisolonum) 1 mg antihistaminikum (Bisulepinum)
 - **závažné alergické stavy**
premedikace po dobu 1-2 dnů ve spolupráci s anesteziologem

Relativní kontraindikace podání k.l.

- závažná alergická reakce po předchozím podání k.l.
- těžké funkční poruchy ledvin a jater (kreatinin nad 300 umol/l)
- thyreotoxikóza – před podáním k.l. thyreostatika
- mnohočetný myelom – zajistit řádnou hydrataci
- jódová k.l. nesmí být podána 2 měsíce před léčbou, event. isotopovým vyšetřením štítné žlázy s izotopy jódu

Vysvětlení níže používaných pojmů:

Nalačno: 6 hod. před vyšetřením nejíst a 12 hod. před vyšetřením jen lehká jídla, pacient může pít.

Vyprázdněn:

Fortrans, klyzma, magnesiová voda – způsob určí odesílající lékař dle stavu pacienta

Doprovod:

S pacientem se na vyšetření dostaví 1 dospělá osoba, může být rodinný příslušník, u hospitalizovaných pacientů 1 sanitář i na více pacientů.

Neakceptujeme řidiče sanitky, pokud nesetrvá s pacientem.

Neřídít MV:

Pacient od okamžiku požití Dithiadenu nesmí minimálně 12 hodin řídit motorové vozidlo.

Jednofázová aplikace k.l. p.o.

Pacient vypije 0,5 – 2,5 hod. před vyšetřením roztok k.l. – 10 ml k.l. v 500 ml tekutiny.

Pacient z lůžkového odd. Nemocnice Hořovice

V případě předpokládané aplikace k.l. (konzultace s lékařem na RDG odd.) zavedena i.v. kanyla nejméně růžového kalibru.